

Feltiella sistēma

Feltiella-System

Bioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis
Reģistrācijas klase: 3

Reģistrācijas Nr 0529

Ražotājs **Biobest Group N.V.**

Ilse Velden 18 - 2260 Westerlo (Belgium)

Tālrunis: +32 14 257 980

SANEMTS Nr. 245

Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 18. g. 21. " marta

Izplatītājs **SIA A.M.OZOLI**

"MIGLAS", Ādažu novads, LV-2164

Reģ. Nr.: 40003522697

Tālrunis: +371 67 904 837

APSTIPRINU

VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

R. Čudere

20 19. g. 23. " marta

Organisma nosaukums

pangodiņš *Feltiella acarisuga* (Vallot 1827)

Organisma raksturojums

kārta – Diptera, dzimta – Cecidomyiidae

Imago 2 mm garš, brūni rozā krāsā, garām kājām. Ola ovāla, iegarena, 0,1 x 0,25 mm, iedzeltena (stadija – nepilnas 2 dienas), kāpurs (trīs attīstības stadijas, kopā – aptuveni 1 nedēļa) 0,2-2,0 mm, dzeltenbrūns, kūniņa pūkaina, netīri balta, 1-1,5 mm fiksējas lapas apakšpusē, lapas dzīslas tuvumā (stadija - aptuveni 1 nedēļa). Kopējais attīstības laiks no olas līdz imago optimālos apstākļos 2-3 nedēļas.

Darbības raksturojums *F. acarisuga* lido, aktīvi meklē tīklērču kolonijas un dēj olas to tuvumā. Pēc izšķilšanās *F. acarisuga* kāpuri barībā izmanto vairāku sugu tīklērces (*Tetranychus urticae*, *Tetranychus cinnabarinus*), to dažādās attīstības stadijās, tai skaitā pārziemojušos īpatņus.

Izmanto tīklērču apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, pipariem, baklažāniem, un zemenēm, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: rozēm, krizantēmām, gerberām, antūrijām, kā arī stādiem kokaudzētavās, stādu mājās.

Iepakojums 1 L plastmasas spainis, kurā atrodas 250 *F. acarisuga* kūniņas koka skaidās. Vai 280 ml plastmasas kaste (kompakts iepakojums), kurā atrodas 250 *F. acarisuga* kūniņas koka skaidās (Low-Volume System).

Lietošanas devas

Kultūra	Devas un lietošanas biežums
Tomāti, pie mērenas invāzijas	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 2-3 reizes
pie augstas invāzijas	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 8 reizes
Gurķi	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 2-3 reizes
Pipari, pie mērenas invāzijas	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 2-3 reizes
pie augstas invāzijas	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 8 reizes
Baklažāni, zemenes, krizantēmas, gerberas, antūrijas, kokaudzētavās	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 4-6 reizes
Rozes pie mērenas invāzijas	250 īp./perēklī/nedēļā, minimums 2-3 reizes

Ieteikumi lietošanai lieto kopā ar *Phytoseiulus persimilis*, bieža sērotāju lietošana samazina *Feltiella acarisuga* darbības efektivitāti (dezorientē telpā). Pavasarī, kad platībā parādās pārziemojušās tīklērces, vietās, kur kaitēklis parādās vispirms, izlaiž 500-750 īp./ha/nedēļā (2-3 iepakojumi), bet augstas invāzijas gadījumā – 2500 īp./ha/nedēļā 6x (10 iepakojumi).

Lietošana Pārdur iepakojuma vāku (sekojot norādēm) un novieto ēnainā vietā, tīklērču koloniju tuvumā vai arī augu rindas galā (uz substrāta maisa). Jāraugās, lai traukā neiekļūst ūdens (laistot).

Uzglabāšana Pēc saņemšanas no piegādātāja ne ilgāk par 1-2 dienām, temperatūrā pie 10°C.

Jutīgums pret kīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem Jutīgs! Interesēties pie izplatītāja.