

PIRMS ĶĪMISKO LĪDZEKĻU
LIETOŠANAS, SADERĪBU
AR BIOLOGISKAJIEM AUGU
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM
VARAT PĀRBAUDĪT
INTERNETA VIETNĒ
WWW.BIOBEST.BE

A.M.Ozoli



IETEIKUMI AUDZĒTĀJIEM

KRŪMMELLENES



Apputeksnēšanas stratēģija mellenēm

www.biobest.be

IETEIKUMI AUDZĒTĀJIEM

KRŪMMELLENES



KOPSAVILKUMS


Kamenes ir efektīvas krūmmelleņu ziedu apputeksnētājas, jo tās ir aktīvākas pie zemām temperatūrām nekā medusbites, kā arī spēj pārnest vairāk putekšņu katra zieda apmeklējuma laikā.

IEGUVUMS VESELĪBAI

Krūmmellenes satur antociānus, kas dod mellenēm raksturīgo zilo krāsu. Šim flavonoīdam ir laba ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, samazinot holesterīna uzkrāšanos asinsvados. Turklat mellenes satur antioksidantus, kas palēnina novecošanās procesu, samazina iekaisumus un palīdz aizsārgāties pret dažādām slimībām.

ZIEDA UZBŪVE

Krūmmellenes ziedam vainaglapas ir balti rozā krāsā, saaugušas kopā un veido zvanveida formu, kas ar šauro atvērumu galā vērsta uz leju. Putekšņlapas ir īsākas par auglenīcu, drīksna atrodas zemāk par putekšnīcām, tādēļ, lai notiktu apputeksnēšana, puteksnim krītot uz leju, jāpieskaras drīksnai un jāpielīp. Mellenes ziedi ir izkārtoti ķekaros un ir liela atšķirība vienā ķekarā starp pirmā un pēdēja ziedēšanas laiku.



AUGĀ ĪPAŠĪBAS

Efektīva apputeksnēšana noved pie kvalitatīva augļa.
Labas kvalitātes ogas īpašības ir:

- ✓ augļa izmērs un svars, kas ir saistīts ar sēklu skaitu
- ✓ zilās krāsas intensitāte un viendabīgums
- ✓ ogas aromāts un mīkstuma blīvums
- ✓ glabāšanas ilgums pēc novākšanas

KRÜMMELLENES



KĀPĒC SVEŠAPPUTE?

Krūmmellenes ir pašapputes augi, bet tādā situācijā ogas būs mazas, lēni gatavosies, var nobirt, var būt nepiemērotas tirdzniecībai.

Krūmmellenēm svešapputes rezultātā veidojas lielākās ogas, kas nogatavojas vienmērīgāk un raža ir lielāka. Svešappute attiecās uz putekšņu pārnesi starp šķirnēm, ko var izdarīt gan kamenes, gan medusbites, tomēr krūmmellenes vairāk iegūst no kameņu vibroapputes.

IEGUVUMI LIETOJOT KAMENES

Kamenes ir ļoti efektīvas krūmmelleņu apputeksnētājas:

✓ **Zemas temperatūras.**

Kamenes ir aktīvas pie zemākām temperatūrām (+/-5°C). Salīdzināšanai, medusbites ziedus vairs neapputeksnē, kad temperatūra ir zem 10-15°C.

✓ **Tumšs un apmācies laiks.**

Kamenes izvēlas noteiktus objektus, kas palīdz labāk orientēties arī tumšās un apmākušās dienās. Savukārt medusbites, lai orientētos, vairāk uzticas saules intensitātei un pozīcijai.

Kamenes ir ilgāk aktīvas – lidot sāk agrāk no rīta un beidz vēlāk vakarā.

✓ **Audzēšana zem seguma.**


Plēves tuneļos un siltumnīcās, kā apputeksnētājus kamenes lieto jau vairākus desmitus gadus. Lai arī medusbites ir tuvu radniecīgas kamenēm, tās nav tik labi apputeksnētāji, jo gaismas staru izplatība caur segumu rada grūtības ar orientāciju. Kamenes tas ietekmē daudz mazāk.

✓ **Ziedu izvēle**

Kamenes apmeklē ziedus, galvenokārt, lai vāktu putekšņus. Tā rezultātā viņas nav izvēlīgas ziedos, kas rezultējas vienmērīgā apputeksnēšanā. Medusbites ne vienmēr ir piemērotas krūmmelleņu apputeksnēšanai, jo ziedi ar mazu nektāra saturu ne vienmēr būs tām pievilcīgi.

✓ **Ātrāki un īsāki ziedu apmeklējumi**

Ziedu apmeklējums minūtē




Kamenes var veikti vibroapputi. Tās apķer ziedu un strauji kustina lidošanas muskulus, tādējādi zieds un putekšnīca novibrē, un tiek nokratīti putekšņi. Tas rezultējas īsākos un ātrākos ziedu apmeklējumos. Medusbites neveic vibroapputi.



KRŪMMELLENES




- ✓ Labāka ziedputekšņu pārnese, ogu aizmešanās un augstākas ražas:



Tā kā kamenes ir lielākas par medusbitēm, tā spēj pārnest vairāk putekšņus un izveidot optimālu kontaktu ar zieda drīksnu. Tas rezultējas vairāk aizmetušās ogās un lielākā kvalitatīvo ogu ražā.


- ✓ Ogu izmērs un svars

Pateicoties tam, ka ogas labāk aizmetās, apputeksnēšana ar kamenēm palielina lielo ogu proporciju, gan pēc svara, gan izmēra, kas gala rezultātā nodrošina viendabīgāku ogu ražu.



- ✓ Agrāka raža

Atsevišķi pētījumi uzrāda, ka apputeksnējot ar kamenēm, ogas nogatavojas 10-14 dienas agrāk, kā arī ogu nogatavošanās klūst vienmērīgāka.



IETEIKUMI AUDZĒTĀJIEM

KRŪMMELLENES



IETEIKUMI APPUTEKSNĒŠANAI

Augļu un ogu kultūru apputeksnēšanai rekomendējam 2 kameņu stropus:

	Lielais strops	Multistrops
Kameņu skaits stropā	Vairāk kā 110	3 saimes, vairāk kā 350
Saimes darbības ilgums	6-8 nedēļas	4-6 nedēļas

✓ Deva

Atklātā laukā 6-9 Lielie stropi vai 2-3 Multistropi uz 1 hektāru. Plēves tuneļos un siltumnīcās 1 Lielais strops uz 750-1000m² vai 3-4 Multistropi uz 1 hektāru.

PIEZĪME: precīzai saimju skaita izvēlei, sazinieties ar izplatītāju.

✓ Laiks

Izvietojiet saimes platībā, kad zied 5-10% ziedu

✓ Saimju izvietošana

Izvietot vienmērīgi par visu platību, maksimāli 250 m starp saimēm. Novietojiet kameņu saimi aptuveni 0.5 m virs zemes, uz horizontālas virsmas. Ja nepieciešams, aizsargājiet saimes no skudrām.

Ja saimes tiek izvietotas atklātā laukā, lietojiet Multistropus. Vai arī pārliecinieties, ka saime ir aizsargāta no vēja, lietus, aukstuma un tiešiem saules stariem. Novietojiet saimi tā, lai stropa skreja būtu vērsta uz dienvidiem. Tas palīdzēs kamenēm agrāk uzsākt darbu.

Atsevišķas vietās stropus ir jāaizsargā no dzīvniekiem izmantojot žogus. Ja tiek lietotas arī medusbites, kameņu saimi novietojiet pēc iespējas tālāk, jo medusbites var pievilināt stropā esošais Biogluc cukura šķidums.

✓ Cīņa ar kaitēkļiem apputeksnēšanas laikā

Lai aizsargātu kamenes, nelietojiet plaša spektra insekticīdus laikā, kad melleņu ziedi ir atvērušies. Rūpīgi sekojot līdzī līdzekļu attīstībai, var maksimāli samazināt vajadzību lietot ķīmiskos līdzekļus. Ja arī insekticīdu lietošana ir nepieciešama, tad lietojiet pēc iespējas mazāk agresīvus līdzekļus ar pēc iespējas īsāku nogaidīšanas laiku. Pirms katras miglošanas, savāciet kamenes stropā un izlaidiet tās balstoties uz rekomendācijām www.biobest.be mājaslapā.

