


Tuta absoluta



Pieaudzis īpatnis



Ola



Kāpurs



Kūniņa



Izgrauztas ejas lapās



Izgrauzti augļi



Izgrauzti stublāji

Pārošanās traucētājs
(feromons)



Macrolophus pygmaeus
(plēsīgā mīkstblaktis)



Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki SA-11
(biopesticīds)



ISONET ° T

Darbība	Deva	Intervāls
Preventīva	800-1.000 gabali/ha Kopā: 1 izlaišana	-

Piezīme: šobrīd ir reģistrēts Holandē, Beļģijā un Anglijā.



100 gab./iekājumā
500 gab./iekājumā

Lietot līdz ar augu iestādīšanu. Feromons apgrūtinā kožu tēviņiem atrasts mātītes, tādejādi tiek apgrūtināta populācijas turpināšanās. Var lietot kopā ar citiem bioloģiskajiem un ķīmiskajiem produktiem.

MACROLOPHUS-SYSTEM (izberams)

Darbība	Deva	Intervāls
Preventīva	1,5-2/m ² Kopā: 2-4 izlaišanas reizes.	1-2 nedēļas



500 gab

DELFIN °


Darbība	Deva	Intervāls
Ne-preventīva	Uz etiķetes	Uz etiķetes

Piezīme: šobrīd Latvijā nav reģistrēts.



1 kg

LĪMPAPĪRI



Limpapīrs melns[®]
(25 x 20 cm)
(25 x 40 cm)



Bug-Scan[®] rullis
Melns (30 cm x 100 m)

FEROMONU SLAZDI UN KAPSULAS



Tutasan slazds



Delta slazds



Kapsulas Tuta absoluta
iekājumā 2 kapsulas