

NEMAFENCE CARPO

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Darbības veids

- *Steinernema carpocapsae*
- Entomopatoģenā nematode
- Satur kaitēkļus nogalinošu simbiotisku baktēriju
- Kaitēklis iet bojā 24 līdz 48 stundu laikā
- Nematodes vairojas saimniekorganismā, kuru vēlāk pamet jauni nematožu kāpuri lai meklētu kaitēkļus.
- Ierobežo kaitēkļus augsnē un uz lapām

Ierobežo

- Tauriņu kāpurus
- Ābolu tinēju
- Trūdodījumus

Izmanto

- Dārzeņiem
- Dekoratīvajiem augiem
- Augļu kokiem

Uzglabāšana

- Izlietot uzreiz pēc saņemšanas
- Ja tas nav iespējams, produktu īslaicīgi var uzglabāt tumšā telpā, ievērojot beigu termiņu, 2-6°C temperatūrā. **NESASALDĒT!**
- nodrošināt labu ventilāciju
- Neuzglabājiet atvērtus iepakojumus, atšķaidītu produktu vai darba suspensijas.

Lietošanas devas

	Augsnē/ substrātā	
Pielietojamā deva	Vispārējai izlaišanai	Invāzijas gadījumā
Deva (īpatņi/m²)	500.000	1 Mil.
Deva (īpatņi/L substrāta)	5.000	10.000
Darba suspensija (L/m²)	1	1
Darba suspensija (L/100L substrāta)	1	1
Lietošanas biežums, intervāls	6 nedēļas	6 nedēļas
Smidzināšanai uz lapām*		
Pielietojamā deva	Preventīvi	
Deva (īpatņi/m²)	250.000	
Darba suspensija (L/ha)	1.000	

* Lai garantētu vienmērīgu pārklājumu līdz kultūrauga galotnei, ieteicams smidzināmajam šķīdumam pievienot virsmas aktīvo vielu vielu.

Lietošana

Darba suspensijas sagatavošana

Vienmēr izmantojiet visu iepakojuma saturu.

- Daļēji piepildiet lietošanas tvertni ar tīru ūdeni istabas temperatūrā.
- Uzmanīgi atveriet iepakojumu un iztukšojiet tā saturu spainī ar ūdeni. Sajauciet, līdz veidojas darba suspensija. Izskalojiet iepakojumu un pievienojiet to tvertnei.
- Piepildiet lietošanas tvertni līdz vajadzīgajam ūdens līmenim, lai iegūtu lietošanai gatavu suspensiju.

Lietošanas nosacījumi

- Lai izvairītos no nematožu aizsprostošanās lietošanas laikā, noņemiet visus filtrus, kuru izmērs ir 300 mikroni vai smalkāks. Minimālais sprauslas diametrs ir 0,5 mm.
- Lai izvairītos no nematožu bojāejas, nepārsniedziet 20 bāru sūkņa spiedienu. Nav ieteicams izmantot virzuļu sūkņus.
- Maisiet regulāri, lai šķīdums būtu homogēns.
- Izvairieties no lietošanas tiešos saules staros. Ieteicams lietot vakarā vai tumšos laikaapstākļos ar aizvērtām ventilācijas lūkām (mazāks izžūšanas risks; mazāks UV starojums).
- Lietošanas laikā un vismaz 2 nedēļas pēc tam augsnes temperatūrai jābūt no 14°C līdz 30°C. Temperatūras ārpus šī diapazona var samazināt efektivitāti.
- Nekad nelietojiet, izmantojot uzpludināšanas sistēmu!
- Pārliedzināties, ka augsne ir mitra, pirms nematodu lietošanas. Nodrošināt, ka 3 nedēļas pēc lietošanas, augsne neizkalst. Laistat, ja ir nepieciešams. Nelietojiet, izmantojot uzpludināšanas sistēmu!

Substrāta salaistīšana: Substrātam jābūt mitram un apstrādes laikā tas nedrīkst izžūt (ja nepieciešams, vispirms samitriniet). Augsnes temperatūra nedrīkst pazemināties zem 14°C 2 nedēļas pēc apstrādes. Nonākušas augsnē, nematodes būs aktīvas līdz 6 nedēļām.

Smidzinot uz lapām: Nodrošiniet vienmērīgu lapotnes pārklājumu bez noteces, lai izvairītos no nematožu zuduma. Ir svarīgi, lai lapas pēc uzklāšanas paliktu mitras vismaz 2 stundas.

SADERĪBA AR ĶĪMISKĪEM AAL LĪDZEKĻIEM

Nematodes nav jūtīgas pret lielāko daļu pesticīdu (izņemot pret nematocīdiem), tādēļ tās iespējams jaukt tvertnes maisījumos. Par nesaderību ar konkrētu pesticīdu interesēties pie ražotāja/izplatītāja kā arī internetā: www.biobestgroup.com – sadaļā "side-effects manual".